

LA PEDICULOSI E' UNA
PARASSITOSI ATTUALMENTE
MOLTO DIFFUSA.

LA PEDICULOSI DEL CAPO SI
MANIFESTA CON PRURITO
INSISTENTE E PUO' PERTANTO
PROVOCARE LESIONI DA
GRATTAMENTO.

SE SI SONO TROVATE LE UOVA E'
NECESSARIO INIZIARE SUBITO
UNA TERAPIA EFFICACE.

NON E' STRETTAMENTE
INDISPENSABILE CHE I BAMBINI
RESTINO A CASA, E' UTILE
TUTTAVIA AVVERTIRE
L'INSEGNANTE.



REGIONE VENETO
UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N° 17

CONSELVE-ESTE-MONSELICE-MONTAGNANA
DIPARTIMENTO IGIENE PUBBLICA

OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

LA PEDICULOSI DEL CAPO



Per informazioni rivolgersi
al Servizio Igiene Pubblica
tel: 049-9598750

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Don Paolo Galliero"-TRIBANO (PD)

Ai Sigg. Genitori degli alunni
Scuola Primaria/Secondaria I grado
dell'Istituto Comprensivo di Tribano

Il servizio di Igiene Pubblica promuove una
campagna informativa per la prevenzione su alcune
malattie che possono colpire gli alunni in età scolare.
Qualora fosse riscontrata la presenza di pidocchi il
genitore deve attenersi scrupolosamente alle
indicazioni per prevenire l'insorgere della Pediculosi:
importanza particolare riveste il controllo quotidiano
dei genitori che nel dubbio è opportuno si rivolgano
al proprio pediatra e/o farmacista di fiducia.
Trasmetto pertanto il volantino perché ogni genitore
possa prevenire opportunamente all'insorgere di tali
manifestazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr.ssa Chiara Martin



LA PEDICULOSI E' UNA PARASSITOSI MOLTO DIFFUSA.

LA MALATTIA

Esistono tre forme di pediculosi causate da tre specie diverse di pidocchi che sono:

- pediculosi del cuoio capelluto
- pediculosi del pube
- pediculosi del corpo

Ora parliamo di pediculosi del capo.

Il pidocchio del capo è un parassita che vive e si riproduce bene sul cuoio capelluto dell'uomo. Lontano dalla testa sopravvive per poche ore.

Il suo sviluppo avviene attraverso vari stadi: da quello iniziale di uova dette lendini, a quello adulto.

LA TRASMISSIONE

Il pinocchio del capo si trasmette facilmente da persona a persona ed anche attraverso oggetti personali quali: berretti, sciarpe, spazzole e pettini. L'ambiente della scuola offre molte possibilità di diffusione, poiché i ragazzi sono più a stretto contatto tra loro.

I SINTOMI

La pediculosi del capo si manifesta con prurito insistente e può pertanto provocare lesioni da grattamento.

LA PREVENZIONE

E' necessario curare particolarmente l'igiene personale:

- lavare spesso i capelli
- usare pettini e spazzole personali
- non utilizzare in comune berretti, sciarpe, ecc.

Quando il ragazzo è affetto da pediculosi, anche i familiari possono essere contagiati. Pertanto, al fine di una completa disinfestazione anch'essi devono essere sottoposti a controlli ed eventuale cura.

E' bene che la famiglia collabori nella lotta contro la pediculosi, con una continua ed attenta sorveglianza. In particolar modo nei periodi in cui i bambini frequentano la scuola o comunità, deve essere attuato un assiduo controllo del capo.

LA RICERCA

Le lendini sono uova di forma ovale, grigiastre, molto aderenti al bordo laterale del capello in prossimità della base; a differenza della forfora che facilmente scivola via, soffiando o pettinando il capello.

LA TERAPIA

Non è indispensabile tagliare i capelli però bisogna usare prodotti antiparassitari che devono essere acquistati in farmacia come: polvere, lozione, shampoo, gel, ecc.

Per l'uso di tali prodotti devono essere seguite attentamente le avvertenze scritte sulle confezioni.

Dopo aver eseguito il trattamento antiparassitario, è importante eliminare tutte le lendini spesso causa di successive reinfestazioni.

Dopo qualsiasi trattamento antiparassitario è indispensabile osservare le seguenti norme:

- lavare i capelli con acqua ed aceto tiepidi (ciò favorisce il distacco delle lendini);
- pettinare i capelli con pettine a denti fitti;
- sfilare con le mani le lendini controllando in particolar modo la zona della fronte, nuca e dietro le orecchie.

Questo deve essere praticato quotidianamente, sino a completa eliminazione delle lendini.

N.B.: Nessun uso prolungato di shampoo antiparassitario previene la pediculosi: esso va usato solo in caso di necessità poiché può essere nocivo.